

Statine	wechselwirkende Protease-Inhibitoren (PI)	Empfehlungen zur Verschreibung des Statins
Atorvastatin	<ul style="list-style-type: none"> • Tipranavir + Ritonavir • Telaprevir (Hepatitis-C-PI) 	Atorvastatin vermeiden
	<ul style="list-style-type: none"> • Lopinavir + Ritonavir 	Atorvastatin vorsichtig einsetzen und so niedrig wie möglich dosieren
	<ul style="list-style-type: none"> • Darunavir + Ritonavir • Fosamprenavir • Fosamprenavir + Ritonavir • Saquinavir + Ritonavir 	nicht über 20 mg Atorvastatin täglich
	<ul style="list-style-type: none"> • Nelfinavir 	nicht über 40 mg Atorvastatin täglich
Fluvastatin		keine Daten vorhanden
Lovastatin	<ul style="list-style-type: none"> • alle HIV-PI • alle Hepatitis-C-PI (Boceprevir, Telaprevir) 	Gegenanzeige (nicht kombinieren!)
Pitavastatin	<ul style="list-style-type: none"> • Atazanavir ± Ritonavir • Darunavir + Ritonavir • Lopinavir + Ritonavir 	Einsatz möglich ohne Dosisbegrenzung
Pravastatin	<ul style="list-style-type: none"> • Darunavir + Ritonavir • Lopinavir + Ritonavir 	Einsatz möglich ohne Dosisbegrenzung
Rosuvastatin	<ul style="list-style-type: none"> • Atazanavir ± Ritonavir • Lopinavir + Ritonavir 	nicht mehr als 10 mg Rosuvastatin einmal täglich*
Simvastatin	<ul style="list-style-type: none"> • alle HIV-PI • alle Hepatitis-C-PI (Boceprevir, Telaprevir) 	Gegenanzeige (nicht kombinieren!)

* Die HIV-PI-Kombinationen Lopinavir/Ritonavir und Atazanavir/Ritonavir erhöhen den Rosuvastatin-Spiegel bis um das Dreifache. Bei diesen Kombinationen sollte daher die tägliche Rosuvastatin-Dosis auf 10 mg begrenzt werden.