

**AIDS
INFO**

**Η σημερινή
επιστημονική
Γνώση επί του
Θέματος**



**Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.**

Συμπτώματα αρρώστειας

Οταν υπάρχουν τα εξής συμπτώματα αρρώστειας, πρέπει να πηγαίνει κανείς οπωσδήποτε στον γιατρό:

- Αυξημένη θερμοκρασία/πυρετός
- ατονία
- ευκοιλιότητα
- καταφανές χάσιμο βάρους
- προσμένα λεμφογιαγγλία
- εφιδρώσεις και ξηρός βήχας
- μπκυτίαση της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα

Τ'ανωτέρω συμπτώματα δεν προκαλούνται μόνο από το AIDS, αλλά και από πολλές άλλες μολυσματικές αρρώστειες.

Οποιος νομίζει, διαβάζοντας το παρόν, ότι έχει ένα από τα συμπτώματα αυτά, δεν χρειάζεται να πανικοβληθεί. Οταν όμως παρουσιάζει πολλά μαζί και για πολλές εβδομάδες, πρέπει, χωρίς να ξένει καιρό, να πάει στον τακτικό γιατρό του.

Κατηγορίες ατόμων που κινδυνεύουν

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά ως τώρα, εχει διαπιστωθεί ότι οι εξής κατηγορίες ατόμων προσβάλλονται κατά το πλείστο από AIDS:

- Ομοφυλόφιλοι
- αρμφισεξουαλικοί
- τοξικομανείς
- αιμοφιλείς, που χρειάζονται μόνιμα μεταγγίσεις
- άτομα που έχουν σεξουαλικές επαφές με τα προ-αναφερόμενα
- νεογέννητα που η μπτέρα έχει μολυνθεί από AIDS.

Μόλυνση

Η αρρώστεια μεταδίδεται όταν ο ίος του AIDS εισχωράσει στο αίμα. Αυτό συμβαίνει πριν απ'όλα κατά τη συνουσία, ιδίως όταν η σεξουαλική επαφή συνδυάζεται με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών. Στους τοξικομανείς ο ίος του AIDS μεταδίδεται με την κοινή χρήση συρίγγων. Ο ίος πρακτικά δεν μεταδίδεται με 1. σάλιο, το φιλί, τα επιτραπέζια σκεύη, τις χειραψίες, δηλαδή την άμεση επαφή, ή με τα ρούχα.

Π.χ. σε σχολεία, τόπους εργασίας, εστιατόρια, κολυμβητήρια, σε ψώνια ή συντροφιές δεν έχει γίνει ως τώρα γνωστό κρούσμα μετάδοσης.

Ιατρική Θεραπεία

Ως τώρα δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα αποτελεσματικής ιατρικής θεραπείας ασθενών που πάσχουν από AIDS με όλα τα συμπτώματα της αρρώστειας. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, δεν κατορθώθηκε επίσης να βρεθεί ως τώρα εμβόλιο κατά του AIDS.

Προληπτική μέτρα

Έπειδή δεν υπάρχει τρόπος θεραπείας του AIDS, το α. γελεσματικότερο μέσο κατά της αρρώστειας αυτής είναι η πρόληψη. Μόνο με τη λήψη προληπτικών μέτρων μπορεί να εμποδιστεί η εξάπλωση της αρρώστειας και το ξέσπασμα επιδημίας AIDS, που θ' απειλούσε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Έπειδή η μετάδοσή της συμβαίνει κατά το πλείστο με την συνουσία, συνιστάται επιτακτικά η χρήση προφυλακτικών ως πολύ αποτελεσματικό μέσο.

Παράλληλα πρέπει να προσέχει κανείς όλως ιδιαίτερα την τήρηση των γενικών κανόνων υγιεινής, ώστε να προλαβαίνει όχι μόνο το AIDS, αλλά και άλλες μολυσματικές αρρώστειες.

Σε παλαιότερες εποχές μεταδοτικές αρρώστειες όπως η φυματίωση, η ελονοσία ή η πανώλη προκαλούσαν τον φόβο και τον τρόμο στους ανθρώπους και ήταν επικίνδυνες. Σήμερα παίρνει ανάλογη θέση το AIDS και αποσχολεί σε μεγάλο βαθμό τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους γιατρούς.

Τί είναι το AIDS

AIDS είναι τ'αρχικά του αγγλικού χαρακτηρισμού «Acquired Immuno Deficiency Syndrome» και η ιατρική ονομασία μιάς άγνωστης ως τώρα μεταδοτικής αρρώστειας.

Ο ίος του AIDS φέρει τον χαρακτηρισμό HIV.

Ο χρόνος επώασης του AIDS φτάνει μέχρι την πενταετία ως τώρα, δηλ. η εκδήλωση της αρρώστειας μπορεί να σημειωθεί μέχρι πέντε χρόνια μετά από τη μόλυνση.

Ο ίος του AIDS προκαλεί εξασθένηση της κανονικά υπάρχουσας στον οργανισμό ανοσίας, ώστε να μη λειτουργεί το αμυντικό σύστημα του οργανισμού και να είναι ο οργανισμός εκτεθειμένος και εντελώς ανίκανος ν'αντιδράσει σε μικρότια που αυτά καθαυτά δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αυτό οδηγεί σε μολύνσεις και αρρώστειες όπως πνευμονία ή διάφορες μορφές καρκίνου, που είναι θανατόφορες.

Ομως δεν αρρωστάνει από AIDS κάθε άπομο που μολύνεται με τον ίο. Δηλαδή δεν αρρωστάνει υποχρεωτικά ο φορέας του AIDS. Πολλά άτομα-φορείς ξεπερνούν τη μόλυνση χωρίς ν'αρρωστήσουν.

Το τέστ αντισωμάτων HIV-AK

Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα αιματολογικής εξέτασης για αντισώματα κατά του ιού (HIV) του AIDS.

Οποιος συνεπώς υποβληθεί σ' αυτό το τέστ, μαθαίνει άν το αίμα του δεν έχει μολυνθεί ως τώρα από τον ίο του AIDS (αποτέλεσμα τέστ = **αρνητικό**), ή ήτι έχει μολυνθεί από τον ίο HIV (αποτέλεσμα τέστ = **θετικό**).

Αυτό δεν σημαίνει όμως καθόλου ότι πάσχει ο ενδιαφερόμενος ήδη από AIDS. Σ'ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που έχουν μολυνθεί, παραμένει η μόλυνση χωρίς συμπτώματα, δηλαδή δεν αρρωσταίνουν από AIDS. Ενα άλλο όμως ποσοστό των μολυνθέντων, προσβάλλεται πραγματικά από την αρρώστεια αργότερα.

Οποιος όμως έχει μολυνθεί – ακόμη και άν ο ίδιος δεν αρρωστήσει και παραμείνει υγιής –, μπορεί να μεταδώσει τον ίο κατά τη συνουσία σε άλλους και να τους μολύνει επίσης.

Επειδή υπάρχει η δυνατότητα να αισθανθεί κανείς άγχος, πρέπει το τέστ να γίνεται ύστερα από διάλογο με πρόσωπο εμπιστοσύνης (σύντροφο, γιατρό, συμβουλευτική υπηρεσία), και να μη το κάνει ποτέ ο ενδιαφερόμενος υπό απομόνωση. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να διεξάγεται το τέστ γνώνυμα, αν το επιθυμεί ο εξεταζόμενος.

Τί πρέπει κανείς να κάνει;

Οποιος φοβάται ότι έχει AIDS, πρέπει να πάει πρώτα στον τακτικό του γιατρό. Εκτός αυτού μπορεί κιανείς ν' αποταθεί στις παρακάτω υπηρεσίες και να υποβληθεί (ανώνυμα) στην αιματολογική εξέταση:

Αρμόδια υγειονομική υπηρεσία

Πανεπιστημιακές κλινικές.

Εκδότης

 **Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.**

Berliner Str. 37, 1000 Berlin 31

Ο αριθμός λογαριασμού
Τράπεζας για συνεισφορές

Deutsche Apotheker- und Ärzte-Bank, Berlin
Konto 003 93 300 (BLZ 100 906 03)
Postgiro Berlin West
Konto 179 00 105 (BLZ 100 100 10)

Πώς Το φυλλάδιο αυτό διανεμήθηκε από τον ίο?

1. Aufl.