Überreicht durch

ICH WEISS WAS ICH TU

Impressum

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Wilhelmstraße 138
10963 Berlin
dah@aidshilfe.de
www.aidshilfe.de
1. Auflage, 2016
Bestellnummer: 171239
Layout: Carmen Janiesch
Druck: X-Press Grafik & Druck GmbH,
Lützowstraße 107-112, 10785 Berlin

Behandlung

Eine Syphilis kann mit Antibiotika-Spritzen gut behandelt werden. Das dauert meistens zwei bis drei Wochen.

Wichtig: Behandlung auf jeden Fall zu Ende führen!

Informiere möglichst viele Sexpartner, damit sie sich auch untersuchen lassen können.

Wenn du HIV-positiv bist, kann es Besonderheiten bei der Behandlung geben. Frag am besten deinen Arzt oder deine Ärztin.

Weitere Infos

iwwit.de/geschlechtskrankheiten

Außerdem findest du auf iwwit.de Infos zu HIV, anderen Geschlechtskrankheiten, Safer Sex, Drogen und anderen Themen.

Deutsche AIDS-Hilfe

Syphilis?!

ICH WEISS WAS ICH TU

„Ich lass mich regelmäßig testen und weiß Bescheid“

www.iwwit.de



Schön ist das nicht:

Die Syphilis-Zahlen steigen, vor allem bei schwulen Männern. Wenn eine Syphilis mehrere Jahre unentdeckt und unbehandelt bleibt, kann sie schwere gesundheitliche Schäden verursachen.

Die gute Nachricht:

Du kannst das Risiko senken. Und Syphilis ist gut behandelbar, wenn man sie früh feststellt.

Übertragung

Syphilis kann beim Sex leicht übertragen werden: beim Blasen und Ficken (egal ob aktiv oder passiv), beim Arschlecken, über gemeinsam gebrauchte Dildos und Gleitmitteltöpfe, beim Fisten.

Die wichtigste Botschaft:

Geh mindestens einmal jährlich zum Syphilis-Test. Auch dann, wenn du keine Symptome bemerkst.

Schutz

Der **beste Schutz** vor Syphilis sind **Diagnose** und **Behandlung**. Dann werden die Erreger nicht weitergegeben.

Senken kannst du das **Risiko** mit **Kondomen** beim Ficken (und für Dildos) und **Handschuhen** beim Fisten (für jeden neuen Partner ein neues Gummi oder einen neuen Handschuh verwenden).

Gleitmitteltöpfe am besten nicht gemeinsam benutzen.

Kontakt mit Syphilisgeschwüren solltest du vermeiden.

Test

Kondome senken das Syphilis-Risiko. Aber auch beim Sex mit Kondom können die Erreger übertragen werden.

Weil man Syphilis-Symptome nicht immer bemerkt, solltest du dich mindestens einmal jährlich auf Syphilis checken lassen, zum Beispiel in einem Testprojekt.

Adressen bekommst du bei einer Aidshilfe in deiner Nähe.