



Налоксон – очень безопасный медикамент

Тем не менее, может случиться,
что человек придет в сознание с
абстинентным синдромом.

**При абстинентном синдроме
нельзя употреблять героин
(или другой опиоид)!**

Сначала опиоиды не оказывают эффекта, так как мозговые рецепторы все еще „заблокированы“. Когда через полчаса опиоиды снова смогут „пристыковаться“, это приводит к еще более тяжелой передозировке, чем раньше!

Признаки абстинентного синдрома исчезают в течение нескольких часов. Тогда еще остающиеся в крови опиоиды снова начинают действовать, и это может привести к повторному дыхательному параличу. Поэтому после приема налоксона необходимо присматривать за пострадавшим еще в течение пары часов.

Naloxon kann Leben retten!

4 Налоксон может спасти жизнь!

© Deutsche Aidshilfe e.V.
Wilhelmstr. 138 | 10963 Berlin
Tel.: 030/69 00 87-0
www.aidshilfe.de | dah@aidshilfe.de

1. Auflage, 2019
DAH-Bestellnummer: 042317

Konzept: Dirk Schäffer
Textgrundlage: Fixpunkt e.V.
Redaktion: Dirk Schäffer, Holger Sweers,
Christina Laußmann
Übersetzung: Macfarlane International;
Alexandra Gurinova
Illustrationen: Caja; Fotolia.de: Khalikov;
Layout: Carmen Janiesch
Druck: schöne drucksachen GmbH,
Bessemmerstr. 76a, 12103 Berlin

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ

RUSSISCH

4 Налоксон может спасти жизнь!

 Deutsche
Aidshilfe

aidshilfe.de

- Более половины смертей от употребления наркотиков в Германии связаны с дыхательным параличом при передозировке.

И в подобных случаях налоксон может спасти жизнь!

- Если ты употребляешь опиаты и получаешь заместительную терапию, то ты можешь получить рецепт на налоксон.
- Спроси в своем пункте помощи людям, живущим с ВИЧ или людям, употребляющим наркотики о курсах первой помощи при употреблении наркотиков. Там ты сможешь также проконсультироваться об употреблении налоксона.

Налоксон безопасен!

SAFE

Налоксон является „противником“ (антагонистом) опиоидов:

Он парализует действие героина, метадона, кодеина и тому подобных веществ, так как он „блокирует“ рецепторы для опиоидов. Поэтому налоксон можно применять при передозировке, когда дыхание замедленное или полностью прекратилось.

Никакого другого эффекта у налоксона нет!

Налоксон в чрезвычайной ситуации: так это работает



В любом случае, прежде всего позвони в скорую помощь 112!

При замедленном дыхании: искусственное дыхание “рот в рот” или “рот в нос”.



Ввести назальный спрей налоксона в нос и распылить его там. Спрея хватает только на одно распыление.

При остановке дыхания: восстановление жизнедеятельности (30 циклов непрямого массажа сердца с частотой два надавливания в секунду, амплитуда ок. 5 см), затем два вдувания воздуха в рот или нос.

Если через 2–3 минуты дыхание или сердцебиение не восстановится, ввести вторую дозу налоксона в другую ноздрю.

В случае необходимости следует продолжать проводить меры восстановления жизнедеятельности и оставаться возле пострадавшего пока не прибудет врач скорой помощи!

