



Не колоть и не вдыхать

Из всех доступных в Германии средств заместительной терапии только диаморфин подходит и допущен к внутривенному использованию.

Другие медикаменты заместительной терапии не относятся к препаратам для внутривенного введения, а также для вдыхания через нос: при введении шприцем и вдыхании через нос очень высок риск передозировки и нанесения вреда здоровью – от воспалений и закупорки вен до тромбозов, инсультов и отмирания тканей.



Substitution – aber sicher!

6 Заместительная терапия – конечно да!

© Deutsche Aidshilfe e.V.
Wilhelmstr. 138 | 10963 Berlin
Tel.: 030/69 00 87-0
www.aidshilfe.de | dah@aidshilfe.de

1. Auflage, 2019
DAH-Bestellnummer: 042319

Konzept: Dirk Schäffer
Redaktion: Dirk Schäffer, Holger Sweers,
Christina Laußmann
Übersetzung: Macfarlane International;
Alexandra Gurinova
Illustrationen: Caja; Fotolia.de; Khalikov;
iStock.com: 1167, Genestro, roccomontoya,
ShowVectorStudio
Layout: Carmen Janiesch
Druck: schöne drucksachen GmbH,
Bessemmerstr. 76a, 12103 Berlin

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ

RUSSISCH

6 Заместительная терапия – конечно да!

Заместительная терапия является наиболее успешной формой лечения опиатной зависимости. В Германии такое лечение получают почти 80.000 человек.

Для большинства людей на первом плане стоят медицинская и социальная стабилизация, а также жизнь без вечного поиска дозы. Другие рассматривают заместительную терапию в качестве идеального трамплина для достижения полностью абстинентной жизни – в том числе и без замещающих медикаментов.

Медикаменты

В Германии для использования в заместительной терапии допущены „старички“ метадон, левометадон и кодеин (назначаемый только в исключительных

случаях), кроме того бупренорфин, бупренорфин с налоксоном, ретардированный морфин и диаморфин (синтетический героин).

Обсуди со своим врачом, какое из средств лучше всего подходит тебе.

В зависимости от дозы, медикаменты заместительной терапии могут действовать значительно сильнее, чем уличный героин. Однако, они не вызывают кайфа, и их действие проявляется позднее – поэтому и длится дольше.



Избегать употребления нескольких видов наркотиков

Если пациенты заместительной терапии принимают такие наркотики как героин, бензодиазепины или алкоголь, то это может приводить к отравлениям, а в худшем случае и к остановке дыхания.

Если ты в дополнение к своей заместительной терапии продолжаешь употреблять другие наркотики или медикаменты, поговори со своим врачом. Часто помочь может повышение дозы или смена препарата заместительной терапии, например, на диаморфин.

Потребители наркотиков, не получающие заместительную терапию у врача, но покупающие ее у дилеров, подвержены особенно высокому риску передозировки: часто они дополнительно принимают различные седативные средства, например, алкоголь и таблетки и в результате бывают буквально ошарашены эффективностью медикамента.

