



**CHECK MICH
DOCH AM
ARSCH**

IMPRESSUM

Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 2013

Bestellnummer 171179

Redaktion: Armin Schafberger, Holger Sweers

Druck: Druckerei Conrad, Breitenbachstr. 34-36, 13509 Berlin

Grafik: atkon AG

MEHR INFOS

Mehr Infos über sexuell übertragbare Infektionen, Testmöglichkeiten und erfolgreiche Behandlung bekommst du auf www.iwwit.de

**INFOS ÜBER HÄUFIGE
SEXUELL ÜBERTRAGBARE
INFEKTIONEN IM ANALBEREICH**

20 SEKUNDEN

FÜR DEINEN ARSCH



Viele schwule Männer haben Infektionen im Enddarm, ohne es zu wissen. Häufig verursachen die Erreger dort nämlich keine Symptome. Das Problem: Die Erreger werden weitergetragen (das kann auch bei Benutzung von Kondomen/Handschuhen passieren) und können dann beim Partner an anderen Stellen zu Beschwerden führen. Unsere Empfehlung: Lass dich einmal jährlich testen, bei mehr als 10 Sexpartnern pro Jahr zweimal jährlich.

GONOKOKKEN (TRIPPER)

- im Enddarm fast immer ohne Symptome
- manchmal Schmerzen, Juckreiz, Beschwerden beim Stuhlgang
- langwierige Entzündung, wird oft nicht erkannt
- eine Gonorrhö (Tripper) erhöht das Risiko einer HIV-Übertragung

BEHANDLUNG: Gonokokken sind gegen viele Antibiotika resistent, Tabletten reichen in der Regel nicht mehr aus. Neuerdings verordnet man eine Spritze (Ceftriaxon) in den Muskel/die Vene und gibt zusätzlich einmal Azithromycin-Tabletten.

CHLAMYDIEN

- oft ohne Symptome
- langwierige, manchmal schwere Entzündung, wird oft nicht erkannt
- eine Chlamydien-Infektion erhöht das Risiko einer HIV-Übertragung

BEHANDLUNG: 7–10 Tage lang Antibiotika-Tabletten (Doxycyclin oder Azithromycin), bei schwerer Entzündung bis zu 3 Wochen.

AB WANN IST EIN TEST SINNVOLL?

Die Tests suchen nach Bakterien-Erbsubstanz, die man manchmal schon nach 1–2, meistens nach 3 Tagen nachweisen kann.

SEXVERZICHT

Bis zum Behandlungserfolg auf Sex verzichten, um die Erreger nicht weiterzutragen oder sich gegenseitig immer wieder anzustecken („Ping-Pong-Infektionen“).

BEHANDLUNGSERFOLG

1. Wenn es Symptome gab und diese verschwunden sind, ist das ein gutes Zeichen, dass die Therapie gewirkt hat.
2. Man kann bei Gonokokken 2 Wochen und bei Chlamydien 6 Wochen nach dem Behandlungsende einen Kontrolltest machen – nicht früher! Der Test sucht nach Erbsubstanz der Bakterien, und die findet sich auch noch eine ganze Zeit, nachdem die Bakterien abgetötet wurden.

PARTNERINFORMATION

Informiere möglichst deine Sexualpartner der letzten Wochen, damit sie sich auch testen und behandeln lassen können – meist sind sie dankbar dafür.

PARTNERBEHANDLUNG

Wenn dein Sexualpartner die Infektion sehr wahrscheinlich auch hat (z. B. wenn ihr in den letzten Tagen oder Wochen Sex hattet), kann man bei ihm sofort mit einer Behandlung beginnen, ohne ihn vorher zu testen. Der Vorteil: Ihr seid die Bakterien gleichzeitig wieder los.

WAS KANN ICH MEINEM ARZT/MEINER ÄRZTIN SAGEN?

„Es wurde ein analer/rektaler Abstrich auf Gonokokken (*Neisseria gonorrhoeae*) und Chlamydien (*Chlamydia trachomatis*) mit Nukleinsäurenachweis durchgeführt. Eine Bakterienkultur wurde nicht angelegt.“